RESTARTIX NUTRITIONAL

Ce să mănânci dacă ai probleme de:

INIMĂ

RINICHI

DIABET

TIROIDĂ

ALIMENTAȚIA CA MEDICAMENT!

eBook pdf

Dr. Andra Zaharia

Medic Specialist Genetică Medicală și Nutriție

Alimentația în cazul Bolilor Cardiovasculare



Ce sunt bolile cardiovasculare?

Bolile cardiovasculare reprezintă un grup de afecțiuni care afectează inima și vasele de sânge. Acestea includ afecțiuni precum hipertensiunea arterială, boala coronariană, insuficiența cardiacă, aritmiile și accidentele vasculare cerebrale. De obicei, bolile cardiovasculare apar ca urmare a acumulării de plăci de aterom pe pereții arterelor, un proces numit ateroscleroză, care îngustează arterele și limitează fluxul de sânge către inimă sau creier.

De ce apar bolile cardiovasculare?

Există mulți factori de risc care contribuie la apariția bolilor cardiovasculare. Printre aceștia se numără fumatul, hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat, diabetul, obezitatea, sedentarismul, și stresul. De asemenea, un stil de viață nesănătos, incluzând o dietă bogată în grăsimi saturate, zahăr și sare, poate accelera procesul de ateroscleroză. Factorii genetici joacă, de asemenea, un rol important, ceea ce înseamnă că persoanele cu antecedente familiale de boli cardiovasculare sunt mai predispuse la aceste afecțiuni.

Care sunt complicațiile în caz de neglijență terapeutică?

Neglijarea tratamentului și a măsurilor preventive poate duce la complicații severe, unele dintre ele fiind chiar fatale. Acestea includ infarctul miocardic (atacul de cord), accidentul vascular cerebral (AVC), insuficiența cardiacă congestivă, și moartea subită cardiacă. De asemenea, pot apărea complicații cronice, precum angina pectorală (durere toracică severă), insuficiență renală, și tulburări cognitive datorate fluxului sangvin insuficient către creier. Toate aceste complicații reduc semnificativ calitatea vieții și pot duce la invaliditate.

Top 10 alimente de consumat pentru sănătatea cardiovasculară:

1. Peștele gras (somon, macrou) – bogat în omega-3, care ajută la reducerea inflamației și a colesterolului.

2. Nucile și semințele – conțin grăsimi sănătoase și fibre.

3. Legumele cu frunze verzi (spanac, kale) – surse excelente de vitamine și minerale.

4. Uleiul de măsline extra virgin – bogat în antioxidanți și grăsimi mononesaturate.

5. Fructele de pădure (afine, zmeură) – pline de antioxidanți care protejează inima.

6. Avocado – conține grăsimi mononesaturate benefice pentru inimă.

7. Cerealele integrale (ovăz, quinoa) – ajută la menținerea unui nivel sănătos de colesterol.

8. Leguminoasele (fasole, linte) – bogate în proteine și fibre.

9. Roșiile – sursă de licopen, un antioxidant puternic.

10. Ciocolata neagră (minim 70% cacao) – poate reduce riscul de boli cardiace datorită conținutului de flavonoide.

Adoptarea unei diete sănătoase și echilibrate, combinată cu un stil de viață activ, este esențială pentru prevenirea și gestionarea bolilor cardiovasculare.

Top 10 alimente pentru cei care suferă de diabet

Ce este diabetul?

Diabetul este o afecțiune cronică ce apare atunci când nivelul de zahăr (glucoză) din sânge este prea mare. Glucoza este principala sursă de energie pentru corp, provenind din alimentele pe care le consumăm. Diabetul se dezvoltă atunci când organismul nu produce suficientă insulină sau nu o utilizează eficient. Insulina este un hormon produs de pancreas care ajută glucoza să intre în celulele corpului pentru a fi folosită ca energie.

Există două tipuri principale de diabet:

- **Diabetul de tip 1:** O boală autoimună în care sistemul imunitar atacă celulele producătoare de insulină din pancreas. Este mai frecvent diagnosticat în copilărie sau adolescență, dar poate apărea la orice vârstă.
- **Diabetul de tip 2:** Apare atunci când organismul nu utilizează eficient insulina sau nu produce suficientă insulină. Este cel mai frecvent tip de diabet și este adesea asociat cu un stil de viață nesănătos.

De ce apare diabetul?

Diabetul poate apărea din mai multe motive, în funcție de tipul acestuia:

- **Diabetul de tip 1** apare de obicei din cauza unei combinații de factori genetici și de mediu. Sistemul imunitar atacă și distruge celulele beta din pancreas care produc insulină, dar motivul exact al acestui răspuns autoimun nu este complet înțeles.
- **Diabetul de tip 2** este strâns legat de stilul de viață și de factori de risc precum:

- **Obezitatea:** Excesul de grăsime corporală, în special grăsimea abdominală, poate contribui la rezistența la insulină.
- **Lipsa de activitate fizică:** Un stil de viață sedentar reduce sensibilitatea organismului la insulină.
- **Alimentația nesănătoasă:** Consumul excesiv de alimente bogate în zahăr și grăsimi nesănătoase contribuie la creșterea în greutate și la rezistența la insulină.
- **Predispoziție genetică:** Istoricul familial de diabet poate crește riscul.
- **Vârsta înaintată:** Riscul de diabet de tip 2 crește odată cu vârsta, în special după 45 de ani.

Complicațiile diabetului în caz de neglijență terapeutică

Diabetul netratat sau gestionat necorespunzător poate duce la o serie de complicații grave, inclusiv:

1. **Bolile cardiovasculare:** Diabetul crește riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral.
2. **Neuropatie diabetică:** Deteriorarea nervilor, în special la nivelul picioarelor, poate duce la durere, amorțeală sau pierderea sensibilității.
3. **Nefropatie diabetică:** Diabetul poate afecta rinichii, ducând la insuficiență renală.
4. **Retinopatie diabetică:** Afectarea vaselor de sânge ale retinei poate provoca pierderea vederii sau orbire.
5. **Picioare diabetice:** Ulcerele și infecțiile picioarelor pot duce la amputări în cazuri grave.
6. **Dermopatia diabetica:** Diabetul poate crește riscul de infecții ale pielii și alte afecțiuni dermatologice.
7. **Hipoglicemie și hiperglicemie:** Gestionarea slabă a diabetului poate duce la niveluri extrem de scăzute (hipoglicemie) sau extrem de ridicate (hiperglicemie) ale glicemiei, ambele fiind periculoase.
8. **Complicații în timpul sarcinii:** Diabetul gestational poate provoca probleme atât pentru mamă, cât și pentru copil, inclusiv creșterea riscului de hipertensiune arterială și naștere prematură.

Top 10 alimente pentru cei care suferă de diabet

Alimentația joacă un rol crucial în gestionarea diabetului. Este foarte important ca persoanele ce sufera de diabet sa reduca aportul de carbohidrati. Iată un top 10 alimente recomandate pentru persoanele cu diabet:

1. **Legume cu frunze verzi:** Spanac, varză kale și alte legume verzi sunt bogate în fibre, vitamine, și au un indice glicemic scăzut.
2. **Peşte gras:** Somon, sardine, macrou, și alte tipuri de pește bogat în omega-3 ajută la reducerea inflamației și îmbunătățirea sănătății inimii.
3. **Nuci şi seminţe:** Migdale, nuci, semințe de chia și in sunt surse excelente de grăsimi sănătoase, proteine și fibre.
4. **Fructe de pădure:** Afinele, zmeura și căpșunile sunt bogate în antioxidanți și au un conținut scăzut de zaharuri naturale.
5. **Leguminoase:** Fasolea, lintea și năutul sunt bogate în proteine, fibre și au un indice glicemic scăzut.
6. **Quinoa:** O sursă bună de proteine vegetale și fibre, care ajută la menținerea unui nivel stabil de zahăr în sânge.
7. **Ulei de măsline extravirgin:** Conține grăsimi mononesaturate sănătoase pentru inimă care pot ajuta la reducerea inflamației.
8. **Avocado:** Bogat în fibre și grăsimi sănătoase, contribuie la controlul nivelului de zahăr din sânge.
9. **Ovăz integral:** O sursă excelentă de fibre solubile care pot ajuta la scăderea colesterolului și la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge.
10. **Iaurt grecesc natural:** Sărac în carbohidrați și bogat în proteine, ajută la menținerea sațietății și la gestionarea glicemiei.

Concluzie

Gestionarea diabetului implică o combinație de alimentație sănătoasă, activitate fizică regulată și tratament medical adecvat. Înțelegerea cauzelor și complicațiilor diabetului, precum și alegerea alimentelor potrivite, poate ajuta la menținerea unei vieți sănătoase și echilibrate.

Cum să prevenim și să gestionăm **Ateroscleroza**



Ce este ateroscleroza?

Ateroscleroza este o afecțiune în care arterele devin îngroșate și rigide din cauza acumulării de plăci de colesterol, grăsimi, calciu și alte substanțe pe pereții acestora. Această acumulare, cunoscută sub numele de placă ateromatoasă, poate îngusta arterele, reducând fluxul de sânge către organe și țesuturi. În timp, ateroscleroza poate duce la blocaje complete, crescând riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral și alte probleme cardiovasculare grave.

De ce apare ateroscleroza?

Ateroscleroza se dezvoltă lent, de obicei începând din copilărie, și se agravează odată cu înaintarea în vârstă. Printre principalele cauze și factori de risc pentru apariția aterosclerozei se numără:

1. **Niveluri ridicate de colesterol "rău" (LDL)**: Un nivel ridicat de lipoproteine cu densitate scăzută (LDL) favorizează acumularea de colesterol pe pereții arterelor.
2. **Hipertensiunea arterială:** Tensiunea arterială crescută poate deteriora pereții arterelor, facilitând depunerea de plăci.
3. **Fumatul:**Substanțele chimice din tutun deteriorează mucoasa arterelor și contribuie la formarea plăcilor.
4. **Diabetul:** Nivelurile ridicate de glucoză din sânge pot deteriora pereții arterelor și pot accelera procesul de ateroscleroză.
5. **Obezitatea:** Excesul de greutate, în special grăsimea abdominală, este asociat cu niveluri crescute de colesterol LDL și trigliceride, fapt ce predispune catre formarea placilor ateromatoase.
6. **Lipsa de activitate fizică:** Sedentarismul contribuie la creșterea colesterolului "rău" și a tensiunii arteriale.

1. **Dieta nesănătoasă:** Consumul de alimente bogate în grăsimi saturate și trans, zaharuri adăugate și sare crește riscul de ateroscleroză.
2. **Factori genetici:** Istoricul familial de boli cardiovasculare poate crește riscul de ateroscleroză.

Complicațiile aterosclerozei în caz de neglijență terapeutică

Dacă ateroscleroza nu este tratată sau gestionată corespunzător, poate duce la o serie de complicații grave:

1. **Boală coronariană:** Placa poate îngusta arterele coronare, reducând fluxul de sânge către inimă și crescând riscul de angină (dureri în piept) și infarct miocardic.
2. **Accident vascular cerebral (AVC):** Dacă ateroscleroza afectează arterele care creierul, poate duce la un accident vascular cerebral ischemic.
3. **Boală arterială periferică:** Placa se poate forma în arterele care alimentează membrele, provocând durere, crampe și, în cazuri severe, gangrenă și amputare.
4. **Anevrism:** O arteră afectată de ateroscleroză poate slăbi și se poate extinde, formând un anevrism care poate rupe și provoca hemoragii interne fatale.
5. **Insuficienţă renală:** Dacă ateroscleroza afectează arterele care alimentează rinichii, poate duce la insuficiență renală.
6. **Complicaţii cardiace:** Ateroscleroza poate contribui la insuficiența cardiacă prin afectarea fluxului de sânge către mușchiul cardiac.
7. **Moarte subită:** Blocarea bruscă a unei artere coronare sau a unei artere cerebrale poate duce la moarte subită.

Top 10 alimente pentru cei care suferă de ateroscleroză

O alimentație sănătoasă poate ajuta la gestionarea și prevenirea progresiei aterosclerozei. Iată 10 alimente recomandate pentru persoanele cu ateroscleroză:

1. **Ulei de măsline extravirgin:** Bogat în grăsimi mononesaturate, ajută la reducerea colesterolului LDL și la creșterea colesterolului "bun" (HDL).
2. **Peşte gras:** Somon, macrou, sardine, bogate în acizi grași omega-3, reduc inflamația și riscul de formare a plăcilor.
3. **Legumele crucifere:** Varza, kale, conopida, broccoli sunt bogate în antioxidanți și fibre, ajută la reducerea nivelului de colesterol.
4. **Fructe de pădure:** Afine, zmeură, căpșuni, care conțin antioxidanți ce protejează arterele de radicalii liberi.
5. **Roşiile:** Sunt bogate in licopen, un carotenoid ce scade LDL, inflamația si creste nivelul de HDL.
6. **Avocado:** Bogat în grăsimi sănătoase și antioxidanți, contribuie la sănătatea cardiovasculară.
7. **Nuci şi seminţe:** Migdale, nuci, semințe de chia și in sunt bogate în fibre, proteine și grăsimi sănătoase care pot reduce colesterolul LDL.
8. **Usturoi:** Conține compuși care pot reduce tensiunea arterială și pot preveni acumularea plăcilor pe artere.
9. **Leguminoase:** Fasolea, lintea și năutul sunt bogate în proteine și fibre și au un indice glicemic scăzut.
10. **Ceai verde:** Bogat în antioxidanți numiți catechine, care ajută la reducerea colesterolului și la îmbunătățirea funcției arteriale.

Concluzie

Ateroscleroza este o afecțiune gravă, dar care poate fi prevenită și gestionată printr-un stil de viață sănătos, dietă adecvată și tratament medical corespunzător. Alegerea alimentelor sănătoase și menținerea unui stil de viață activ pot ajuta la reducerea riscului de complicații și la protejarea sănătății inimii și a vaselor de sânge.



Ce este hiperuricemia?

Hiperuricemia reprezintă un nivel ridicat de acid uric în sânge. Acidul uric este o substanță chimică produsă atunci când organismul descompune purinele, compuși ce se găsesc în mod natural în anumite alimente și băuturi (precum carne roșie, fructe de mare și alcool). În mod normal, acidul uric este filtrat de rinichi și eliminat prin urină, dar atunci când organismul produce prea mult acid uric sau nu îl elimină suficient, nivelul acestuia poate crește în sânge, ducând la hiperuricemie.

De ce apare hiperuricemia?

Hiperuricemia poate apărea din mai multe motive, incluzând:

1. **Exces de purine în dietă:** Consumul excesiv de alimente și băuturi bogate în purine, cum ar fi carnea roșie, fructele de mare, organele animale și alcoolul (în special berea), poate crește nivelul de acid uric.
2. **Producţia excesivă de acid uric:** Unele afecțiuni metabolice sau genetice pot determina organismul să producă mai mult acid uric decât de obicei.
3. **Eliminarea insuficientă de acid uric:** Afecțiuni ale rinichilor, precum insuficiența renală, pot reduce capacitatea rinichilor de a elimina acidul uric din organism.
4. **Factori genetici:** Persoanele cu un istoric familial de hiperuricemie sau gută au un risc crescut de a dezvolta această afecțiune.
5. **Obezitatea:**Excesul de greutate poate crește producția de acid uric și poate reduce capacitatea rinichilor de a-l elimina.
6. **Medicamente:** Anumite medicamente, precum diureticele tiazidice, aspirina în doze mici și imunosupresoarele, pot crește nivelul de acid uric.

Hiperuricemia poate apărea din alte afecțiuni medicale cum ar fi :

Hipertensiunea arterială, diabetul, hipotiroidismul și psoriazisul pot contribui, de asemenea, la creșterea nivelului de acid uric.

Complicațiile hiperuricemiei în caz de neglijență terapeutică

Dacă hiperuricemia nu este gestionată corespunzător, poate duce la o serie de complicații serioase:

1. **Guta:** O afecțiune inflamatorie extrem de dureroasă cauzată de acumularea de cristale de acid uric în articulații, care provoacă inflamație, roșeață, umflare și durere intensă, mai frecvent la degetul mare de la picior.
2. **Formarea de tofi gutosi:** Depozite dure de cristale de acid uric care se formează sub piele, în jurul articulațiilor sau chiar pe cartilajele urechii, provocând deformări și dureri articulare.
3. **Nefropatie urică acută:** Depunerea de cristale de acid uric în rinichi poate duce la blocarea tubilor renali și insuficiență renală acută.
4. **Pietre la rinichi (calculi renali):** Cristalele de acid uric se pot acumula în rinichi, formând pietre care pot cauza dureri severe, greață și dificultăți la urinare.
5. **Boală renală cronică:**Pe termen lung, hiperuricemia netratată poate contribui la deteriorarea permanentă a rinichilor și poate agrava insuficiența renală.
6. **Risc crescut de boli cardiovasculare:** Există o asociere între nivelurile ridicate de acid uric și un risc crescut de hipertensiune arterială, boli coronariene și accident vascular cerebral.

Top 10 alimente pentru cei care suferă de hiperuricemie

Gestionarea hiperuricemiei se poate face eficient printr-o dietă adecvată. Iată 10 alimente recomandate:

1. **Cireşe:** Cireșele și sucul de cireșe pot ajuta la scăderea nivelului de acid uric și la reducerea riscului de atacuri de gută.
2. **Fructe bogate în vitamina C:** Citricele (portocale, lămâi), căpșunile și kiwi-ul pot reduce nivelul de acid uric prin creșterea excreției acestuia.
3. **Legume cu conţinut scăzut de purine:** Castraveți, salată verde, broccoli, conopidă, roșii, și ardei gras sunt bogate în nutrienți și au un conținut scăzut de purine.
4. **Ovăz:** O sursă bună de fibre, ovăzul ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge și la reducerea inflamației.
5. **Produse lactate degresate:** Laptele degresat și iaurtul natural pot ajuta la scăderea nivelului de acid uric prin creșterea excreției acestuia prin urină.
6. **Ceai verde:** Bogat în antioxidanți, ceaiul verde poate contribui la reducerea nivelului de acid uric și la protejarea rinichilor.
7. **Ulei de măsline extravirgin:** Conține grăsimi sănătoase și antioxidanți care ajută la reducerea inflamației și protejarea arterelor.
8. **Cereale integrale:** Quinoa, orez brun, hrișcă și pâine integrală pot oferi fibre și nutrienți importanți, ajutând la menținerea unui nivel stabil de zahăr în sânge.
9. **Nuci şi seminţe:** Migdalele, nucile și semințele de in sunt surse bune de proteine sănătoase și grăsimi nesaturate care nu cresc nivelul de acid uric.
10. **Apă:** Hidratarea adecvată este esențială pentru prevenirea depunerii de cristale de acid uric în rinichi. Se recomandă consumul a cel puțin 8 pahare de apă pe zi.

Concluzie

Hiperuricemia poate avea complicații grave dacă nu este tratată sau gestionată corespunzător. Prin adoptarea unei diete sănătoase și a unui stil de viață activ, este posibilă menținerea nivelului de acid uric sub control și reducerea riscului de apariție a complicațiilor.

Este important să colaborezi cu medicul tău pentru a dezvolta un plan de tratament personalizat și pentru a preveni eventualele probleme de sănătate asociate.



Ce este hipercolesterolemia?

Hipercolesterolemia este o afecțiune caracterizată prin niveluri ridicate de colesterol în sânge. Colesterolul este o substanță grasă esențială pentru organism, utilizată în formarea membranelor celulare, producerea de hormoni și vitamina D. Există două tipuri principale de colesterol: colesterolul "rău" (LDL – lipoproteine cu densitate scăzută) și colesterolul "bun" (HDL – lipoproteine cu densitate mare). Hipercolesterolemia apare atunci când există un exces de colesterol LDL în sânge, care se poate depune pe pereții arterelor, ducând la îngustarea și rigidizarea acestora, proces numit ateroscleroză.

De ce apare hipercolesterolemia?

Hipercolesterolemia poate apărea din mai multe motive, inclusiv:

1. **Dieta bogată în grăsimi saturate și trans:** Consumul excesiv de alimente bogate în grăsimi saturate (carne grasă, produse lactate integrale, prăjeli) și grăsimi trans (produse de patiserie, alimente procesate) poate crește nivelul de colesterol LDL.
2. **Lipsa de activitate fizică:** Sedentarismul poate duce la creșterea colesterolului LDL și la scăderea colesterolului HDL.
3. **Obezitatea:** Excesul de greutate, în special grăsimea abdominală, este asociat cu niveluri ridicate de colesterol LDL și trigliceride.
4. **Factori genetici:** Hipercolesterolemia familială este o afecțiune genetică care afectează metabolismul colesterolului și crește semnificativ riscul de boli cardiovasculare.
5. **Fumatul:** Fumatul reduce nivelul de colesterol HDL și crește riscul de formare a plăcilor pe pereții arterelor.
6. **Consumul excesiv de alcool:** Alcoolul în cantități mari poate crește nivelul de colesterol total și de trigliceride.
7. **Afecțiuni medicale preexistente:** Diabetul, hipotiroidismul, boala cronică de rinichi și alte boli pot contribui la creșterea nivelului de colesterol.
8. **Medicamente:** Anumite medicamente, cum ar fi diureticele, steroizii, beta-blocantele, pot influența nivelurile de colesterol.

Complicațiile hipercolesterolemiei în caz de neglijență terapeutică

Dacă hipercolesterolemia nu este gestionată corespunzător, poate duce la o serie de complicații grave:

1. **Boala coronariană:** Nivelurile ridicate de colesterol LDL pot cauza depuneri de plăci pe pereții arterelor coronare, reducând fluxul de sânge către inimă și crescând riscul de angină pectorală (dureri în piept) și infarct miocardic.
2. **Accident vascular cerebral (AVC):** Plăcile de colesterol care se formează în arterele care alimentează creierul pot duce la blocarea fluxului de sânge, cauzând un accident vascular cerebral ischemic.
3. **Boală arterială periferică:** Ateroscleroza poate afecta arterele care alimentează membrele, provocând dureri și crampe musculare în timpul mersului.
4. **Anevrism aortic:** Hipercolesterolemia poate duce la slăbirea pereților arterei aorte, formând un anevrism care poate rupe și provoca hemoragii interne severe.
5. **Boală renală cronică:** Depunerea de plăci de colesterol în arterele care alimentează rinichii poate duce la insuficiență renală cronică.
6. **Dislipidemie:** Niveluri ridicate de colesterol LDL și trigliceride și niveluri scăzute de colesterol HDL cresc riscul de boli cardiovasculare.
7. **Moarte subită:** Blocajele bruste ale arterelor coronare pot duce la moarte subită.

Top 10 alimente pentru cei care suferă de hipercolesterolemie

Adoptarea unei diete sănătoase este esențială pentru gestionarea nivelurilor de colesterol. Iată 10 alimente recomandate pentru persoanele cu hipercolesterolemie:

1. **Ovăz:** Bogat în fibre solubile, ovăzul poate reduce nivelul de colesterol LDL prin împiedicarea absorbției acestuia în sânge.
2. **Nuci şi seminţe:** Migdalele, nucile, semințele de in și chia sunt surse excelente de grăsimi sănătoase, fibre și antioxidanți care ajută la scăderea colesterolului LDL.
3. **Ulei de măsline extravirgin:** Conține grăsimi mononesaturate și antioxidanți care ajută la reducerea colesterolului "rău" și la creșterea colesterolului "bun."
4. **Leguminoase:** Fasolea, lintea, năutul sunt surse bune de proteine vegetale și fibre care ajută la reducerea nivelului de colesterol LDL.
5. **Peşte gras:** Somonul, macroul, sardinele sunt bogate în acizi grași omega-3, care reduc inflamația și nivelurile de trigliceride.
6. **Avocado:** O sursă excelentă de grăsimi mononesaturate, avocado ajută la scăderea colesterolului LDL și la creșterea HDL.
7. **Fructe bogate în fibre:** Merele, perele, căpșunile și citricele conțin fibre solubile care ajută la reducerea nivelului de colesterol.
8. **Legume cu frunze verzi:** Spanacul, kale, broccoli sunt bogate în antioxidanți și pot contribui la reducerea nivelului de colesterol.
9. **Ceai verde:** Conține antioxidanți care pot ajuta la reducerea nivelului de colesterol LDL și la îmbunătățirea sănătății arteriale.
10. **Ciocolată neagră:** Bogată în flavonoide, ciocolata neagră cu conținut ridicat de cacao poate ajuta la reducerea colesterolului "rău" și la îmbunătățirea funcției arteriale.

Concluzie

Hipercolesterolemia este o afecțiune care poate avea consecințe grave asupra sănătății, dar poate fi gestionată eficient prin adoptarea unui stil de viață sănătos, includerea alimentelor potrivite în dietă, renunțarea la obiceiurile nocive și respectarea tratamentului prescris.

Prin monitorizarea atentă a nivelurilor de colesterol și menținerea unui echilibru alimentar și al stilului de viață, riscul de complicații cardiovasculare poate fi redus semnificativ.



Ce este hipotiroidismul?

Hipotiroidismul este o afecțiune în care glanda tiroidă nu produce suficienți hormoni tiroidieni, esențiali pentru reglarea metabolismului organismului. Glanda tiroidă, situată în partea din față a gâtului, produce doi hormoni principali: tiroxina (T4) și triiodotironina (T3). Acești hormoni controlează funcții vitale ale corpului, cum ar fi ritmul cardiac, temperatura corpului și metabolismul. Când nivelul acestor hormoni este scăzut, metabolismul încetinește, afectând funcționarea normală a organismului.

De ce apare hipotiroidismul?

Hipotiroidismul poate apărea din mai multe motive:

1. **Tiroidita Hashimoto:** Cea mai frecventă cauză de hipotiroidism, această afecțiune autoimună face ca sistemul imunitar să atace glanda tiroidă, ducând la scăderea funcției tiroidiene.
2. **Tratamentul pentru hipertiroidism:** Tratamentul cu iod radioactiv sau medicamente antitiroidiene utilizate pentru hipertiroidism pot duce la hipotiroidism prin reducerea funcției glandei tiroide.
3. **Intervenții chirurgicale:** Îndepărtarea parțială sau totală a glandei tiroide (tiroidectomie) din cauza cancerului de tiroidă, a nodulilor tiroidieni sau a bolii Grave poate determina apariția hipotiroidismului.
4. **Lipsa de iod:** Iodul este esențial pentru producerea hormonilor tiroidieni. Deficiența de iod în dietă poate duce la hipotiroidism, deși acest lucru este mai rar în țările dezvoltate unde sarea este iodată.
5. **Afecțiuni hipofizare:** O tumoră sau o afecțiune a glandei pituitare (hipofiza) poate afecta producția de hormon de stimulare tiroidiană (TSH), necesar pentru reglarea funcției tiroidiene.
6. **Medicamente:** Anumite medicamente, cum ar fi litiul (utilizat pentru tratarea tulburării bipolare), pot interfera cu producția de hormoni tiroidieni.
7. **Factori genetici:** Unii oameni se nasc cu o glandă tiroidă subdezvoltată sau absentă, o afecțiune cunoscută sub numele de hipotiroidism congenital.
8. **Înaintarea în vârstă:** Riscul de hipotiroidism crește odată cu vârsta, în special la femei.

Complicațiile hipotiroidismului în caz de neglijență terapeutică

Dacă hipotiroidismul nu este tratat, poate duce la complicații severe:

1. **Mixedem:** O formă severă de hipotiroidism, care poate provoca umflături, dificultăți respiratorii, ritm cardiac scăzut și temperatură corporală scăzută. Mixedemul poate duce la comă și poate fi fatal.
2. **Boala cardiovasculară:** Nivelurile scăzute de hormoni tiroidieni pot crește nivelul de colesterol LDL (colesterol "rău"), ceea ce crește riscul de ateroscleroză, atac de cord și accident vascular cerebral.
3. **Infertilitate:** Femeile cu hipotiroidism netratat pot avea probleme de fertilitate din cauza neregularităților menstruale și a ovulației.
4. **Complicații în sarcină:** Hipotiroidismul necontrolat în timpul sarcinii poate crește riscul de avort spontan, naștere prematură, greutate mică la naștere și probleme de dezvoltare pentru copil.
5. **Neuropatie periferică:** Nivelurile scăzute de hormoni tiroidieni pot duce la afectarea nervilor periferici, provocând dureri, furnicături sau slăbiciune la nivelul mâinilor și picioarelor.
6. **Depresie:** Hipotiroidismul poate contribui la depresie sau la agravarea simptomelor acesteia.
7. **Goitru (gușă):** Glanda tiroidă se poate mări în încercarea de a produce mai mulți hormoni, provocând gușă.
8. **Cognitive impairment:** Hipotiroidismul sever și netratat poate duce la afectarea funcțiilor cognitive, cum ar fi concentrarea și memoria.

Top 10 alimente pentru cei care suferă de hipotiroidism

Gestionarea hipotiroidismului include, pe lângă tratamentul medicamentos, și adoptarea unei diete sănătoase. Iată 10 alimente recomandate pentru persoanele care suferă de hipotiroidism:

1. **Pește gras:** Somon, macrou, sardine sunt bogate în acizi grași omega-3 și seleniu, care ajută la reducerea inflamației și susțin funcția tiroidiană.
2. **Ouă:** Oferă o sursă bună de iod și seleniu, ambele necesare pentru producția de hormoni tiroidieni.
3. **Legume cu frunze verzi:** Spanac, kale, broccoli, sunt bogate în antioxidanți și minerale esențiale pentru sănătatea generală.
4. **Fructe de mare:** Scoici, creveți, stridii conțin iod, un mineral important pentru funcția tiroidiană.
5. **Nuci de Brazilia:** O sursă excelentă de seleniu, esențial pentru producerea de hormoni tiroidieni.
6. **Iaurt și produse lactate:** Lactatele pot oferi un aport bun de iod, esențial pentru funcția tiroidei.
7. **Fructe bogate în vitamina C:** Citricele, kiwi-ul, căpșunile ajută la reducerea inflamației și la îmbunătățirea sănătății glandei tiroide.
8. **Ulei de cocos:** Poate ajuta la stimularea metabolismului și la reglarea nivelului de energie, dar se consuma cu moderație.
9. **Leguminoase:** Fasolea, lintea sunt bogate în fibre și proteine, ajutând la menținerea unei greutăți sănătoase.
10. **Ceai verde:** Conține antioxidanți care pot ajuta la protejarea glandei tiroide și la menținerea unui metabolism sănătos.

Concluzie

Hipotiroidismul este o afecțiune care necesită monitorizare și tratament adecvat pentru a preveni complicațiile pe termen lung. Prin combinarea tratamentului medical cu o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos, persoanele cu hipotiroidism pot menține o calitate bună a vieții.

Dacă bănuiești că suferi de hipotiroidism sau ai simptome sugestive, este esențial să consulți un medic pentru diagnostic și recomandări de tratament.



Ce este boala cronică renală?

Boala cronică renală (BCR) este o afecțiune caracterizată prin deteriorarea progresivă și ireversibilă a funcției rinichilor pe o perioadă de luni sau ani. Rinichii au rolul de a filtra deșeurile și excesul de apă din sânge pentru a forma urina, de a regla echilibrul electrolitic și de a produce hormoni importanți pentru controlul tensiunii arteriale și formarea globulelor roșii. În boala cronică renală, funcția renală este afectată, iar organismul nu poate elimina eficient toxinele și excesul de lichide.

De ce apare boala cronică renală?

Boala cronică renală poate apărea din diverse cauze, incluzând:

1. **Diabetul zaharat:** Este cea mai frecventă cauză de boală cronică renală. Hiperglicemia cronică poate deteriora vasele mici de sânge din rinichi, afectând capacitatea acestora de a filtra sângele.
2. **Hipertensiunea arterială:** Presiunea ridicată constantă asupra vaselor de sânge poate duce la deteriorarea rinichilor în timp.
3. **Glomerulonefrita:** Inflamația glomerulilor (unități de filtrare ale rinichilor) poate reduce capacitatea acestora de a elimina deșeurile și de a regla echilibrul de lichide.
4. **Bolile renale polichistice:** Această afecțiune ereditară cauzează formarea de chisturi în rinichi, care pot duce la pierderea funcției renale.
5. **Infectii renale recurente (pielonefrita):** Infecțiile renale repetate pot deteriora rinichii.
6. **Afecțiuni autoimune:** Lupusul și alte boli autoimune pot afecta rinichii prin inflamație.
7. **Consumul excesiv de medicamente:** Utilizarea pe termen lung a unor medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) și a altor medicamente nefrotoxice poate duce la leziuni renale.
8. **Obstrucția tractului urinar:** Problemele care blochează fluxul de urină (de exemplu, pietrele la rinichi, hipertrofia benignă de prostată) pot provoca leziuni renale.
9. **Factori genetici și vârstă:** Anumite mutații genetice și înaintarea în vârstă cresc riscul de boală cronică renală.

Complicațiile bolii cronice renale în caz de neglijență terapeutică

Dacă boala cronică renală nu este gestionată corespunzător, pot apărea o serie de complicații grave:

1. **Insuficienţă renală cronică (stadială):** Funcția renală se poate deteriora treptat până la punctul în care rinichii nu mai pot funcționa deloc (stadiul 5 de boală cronică renală), necesitând dializă sau transplant de rinichi.
2. **Hipertensiune arterială agravată:** Rinichii deteriorați nu pot regla corect tensiunea arterială, ceea ce poate duce la agravarea hipertensiunii și a complicațiilor asociate.
3. **Anemie:** Rinichii produc eritropoietină, un hormon necesar pentru producția de globule roșii. BCR poate duce la deficit de eritropoietină și, implicit, la anemie.
4. **Tulburări electrolitice:** Dezechilibrele de potasiu, sodiu, calciu și fosfor pot apărea, afectând funcționarea normală a inimii, oaselor și a sistemului nervos.
5. **Boala cardiovasculară:** Persoanele cu boală cronică renală au un risc crescut de boli cardiovasculare, inclusiv infarct miocardic și accident vascular cerebral.
6. **Fragilitate osoasă:** BCR afectează metabolismul calciului și fosforului, ducând la oase fragile și osteoporoză.
7. **Acidoză metabolică:** Rinichii deteriorați nu mai pot menține echilibrul acido-bazic al organismului, ceea ce duce la acumularea de acid în sânge.
8. **Complicaţii neurologice:** Pot apărea confuzie, dificultăți de concentrare și alte probleme neurologice din cauza acumulării de toxine în sânge.
9. **Retenţie de lichide:** Rinichii nu pot elimina excesul de apă, ceea ce poate duce la edeme, hipertensiune arterială și acumularea de lichid în plămâni (edem pulmonar).
10. **Probleme gastrointestinale:** Greață, vărsături și pierderea poftei de mâncare pot apărea ca urmare a acumulării de deșeuri în sânge.

Top 10 alimente pentru cei care suferă de boală cronică renală

Persoanele cu boală cronică renală trebuie să urmeze o dietă specifică pentru a reduce povara asupra rinichilor și pentru a preveni complicațiile. Iată 10 alimente recomandate:

1. **Fructe cu conținut scăzut de potasiu:** Merele, afinele, strugurii și căpșunile sunt opțiuni bune pentru a limita aportul de potasiu.
2. **Albuș de ou:** O sursă excelentă de proteine de înaltă calitate, cu un conținut scăzut de fosfor.
3. **Uleiuri sănătoase:** Uleiul de măsline și uleiul de avocado sunt surse bune de grăsimi sănătoase, fără colesterol sau sodiu.
4. **Ardei gras:** Bogat în vitamina C și alte antioxidanți, dar cu un conținut scăzut de potasiu.
5. **Conopidă:** O sursă bună de fibre, vitamina C și vitamina K, cu un conținut scăzut de potasiu.
6. **Varză:** Varza are un conținut scăzut de potasiu și este bogată în vitamina K, vitamina C și fibre.
7. **Usturoi:** Usturoiul este bun pentru îmbunătățirea gustului alimentelor fără a adăuga sare și oferă și beneficii antiinflamatorii.
8. **Ceapă:** Bogată în flavonoide și antioxidanți, ceapa ajută la reducerea inflamației și la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare.
9. **Păstârnac:** Un substitut excelent pentru cartofi, oferind fibre și substanțe nutritive fără niveluri ridicate de potasiu.
10. **Orez alb sau orez de conopidă:** Alternative bune la cerealele bogate în fosfor și potasiu(cum ar fi quinoa sau orezul brun).

Concluzie

Boala cronică renală este o afecțiune gravă care necesită atenție medicală și gestionare adecvată pentru a preveni complicațiile și a menține o calitate bună a vieții.

Adoptarea unei diete corespunzătoare, gestionarea factorilor de risc și respectarea tratamentului prescris sunt esențiale pentru a încetini progresia bolii și pentru a minimiza impactul acesteia asupra sănătății generale.

Ce este steatoza hepatică?

Steatoza hepatică, cunoscută și sub denumirea de "ficat gras", este o afecțiune caracterizată prin acumularea excesivă de grăsimi în celulele hepatice. În mod normal, ficatul conține o cantitate mică de grăsime, însă când aceasta depășește 5-10% din greutatea totală a ficatului, se consideră că există steatoză hepatică. Această afecțiune poate varia de la o formă simplă, fără inflamație (steatoză hepatică nealcoolică), până la o formă mai severă, cu inflamație și leziuni hepatice (steatohepatită nealcoolică - NASH).

De ce apare steatoza hepatică?

Steatoza hepatică poate avea diverse cauze, printre care:

1. **Consumul excesiv de alcool:** Este o cauză comună a steatozei hepatice alcoolice. Consumul constant și excesiv de alcool poate duce la acumularea de grăsimi în ficat și la deteriorarea acestuia.
2. **Obezitatea:** Persoanele cu un indice de masă corporală (IMC) ridicat au un risc crescut de acumulare de grăsimi în ficat, datorită excesului de calorii și lipide stocate în corp.
3. **Diabetul de tip 2 şi rezistenţa la insulină:** Persoanele cu diabet sau rezistență la insulină au un risc crescut de dezvoltare a steatozei hepatice nealcoolice, deoarece insulina insuficientă sau ineficientă poate determina ficatul să producă mai multe grăsimi.
4. **Sindromul metabolic:** Această condiție include o combinație de hipertensiune arterială, glicemie crescută, grăsimi în sânge (trigliceride) și obezitate abdominală, toate contribuind la acumularea de grăsimi în ficat.
5. **Hiperlipidemia:** Nivelurile ridicate de colesterol și trigliceride din sânge pot favoriza depunerea grăsimilor în ficat.
6. **Dietă nesănătoasă:** O dietă bogată în grăsimi saturate, carbohidrați rafinați și zahăr poate contribui la acumularea de grăsimi în ficat.
7. **Sedentarism:** Lipsa activității fizice favorizează acumularea de grăsimi în ficat.
8. **Factori genetici:** Unele persoane au o predispoziție genetică pentru a acumula grăsimi în ficat.
9. **Medicamente:** Anumite medicamente, cum ar fi corticosteroizii, tamoxifenul și medicamentele antiretrovirale, pot cauza steatoză hepatică.
10. **Alte afecţiuni:** Boli precum hipotiroidismul, apneea obstructivă în somn și anumite infecții virale (de exemplu, hepatita C) pot crește riscul de steatoză hepatică.

Complicațiile steatozei hepatice în caz de neglijență terapeutică

Dacă steatoza hepatică nu este gestionată corespunzător, poate duce la o serie de complicații severe:

1. **Steatohepatită nealcoolică (NASH):** Aceasta este o formă mai severă de ficat gras, care implică inflamație și leziuni ale celulelor hepatice. Poate progresa către stadii mai avansate de boală hepatică.
2. **Fibroză hepatică:** Inflamația cronică poate duce la formarea de țesut cicatricial (fibroză) în ficat, afectând funcționarea acestuia.
3. **Ciroza hepatică:** Este o complicație severă în care țesutul cicatricial extins înlocuiește țesutul hepatic sănătos, afectând grav funcția hepatică. Ciroza poate provoca insuficiență hepatică și poate necesita transplant de ficat.
4. **Cancer hepatic:** Persoanele cu steatohepatită nealcoolică și ciroză au un risc crescut de dezvoltare a cancerului hepatic, în special carcinom hepatocelular.
5. **Insuficiență hepatică:** În stadiile avansate, ficatul poate înceta să funcționeze corect, necesitând tratament de urgență sau transplant.
6. **Boli cardiovasculare:** Steatoza hepatică este asociată cu un risc crescut de boli cardiovasculare, cum ar fi atac de cord sau accident vascular cerebral.
7. **Diabet de tip 2 agravat:** Persoanele cu steatoză hepatică au un risc crescut de dezvoltare și agravare a diabetului de tip 2.
8. **Hipertensiune portală:** Ciroza poate duce la hipertensiune portală, o afecțiune în care presiunea din venele care alimentează ficatul devine prea mare, provocând complicații severe, cum ar fi varice esofagiene.
9. **Ascită:** Acumularea de lichid în cavitatea abdominală din cauza insuficienței hepatice sau hipertensiunii portale.
10. **Encefalopatie hepatică:** O acumulare de toxine în sânge din cauza funcționării inadecvate a ficatului poate afecta creierul, provocând confuzie, somnolență și, în cazuri severe, comă.

Top 10 alimente pentru cei care suferă de steatoză hepatică

Adoptarea unei diete sănătoase este esențială pentru gestionarea steatozei hepatice. Iată 10 alimente recomandate:

1. **Peşte gras:** Somonul, sardinele și macroul sunt bogate în acizi grași omega-3, care ajută la reducerea inflamației și a nivelului de grăsimi din ficat.
2. **Legume crucifere:** Broccoli, varza de Bruxelles, conopida și varza conțin substanțe care ajută la detoxifierea ficatului și protejează celulele hepatice.
3. **Ulei de măsline:** Conține grăsimi sănătoase mononesaturate și antioxidanți care reduc inflamația și îmbunătățesc funcția ficatului.
4. **Nuci:** Nucile, migdalele și semințele de in sunt bogate în omega-3 și alți nutrienți care susțin sănătatea hepatică.
5. **Ceai verde:** Conține catechine, antioxidanți care pot proteja ficatul de acumularea excesivă de grăsimi și de inflamație.
6. **Ovăz:** Bogat în fibre, ovăzul ajută la menținerea unui nivel sănătos de zahăr din sânge și la controlul greutății, reducând riscul de acumulare a grăsimilor în ficat.
7. **Fructe bogate în antioxidanţi:** Afinele, căpșunile, zmeura și cireșele pot ajuta la protejarea ficatului împotriva leziunilor cauzate de radicalii liberi.
8. **Avocado:** Conține grăsimi sănătoase și antioxidanți care pot ajuta la reducerea inflamației și la protejarea ficatului.
9. **Cereale integrale:** Orezul brun, quinoa și pâinea integrală sunt bogate în fibre și pot ajuta la controlul nivelului de zahăr din sânge și la prevenirea steatozei hepatice.
10. **Leguminoase:** Fasolea, lintea și mazărea sunt surse excelente de proteine vegetale și fibre, ajutând la menținerea greutății și la reducerea riscului de diabet și steatoză hepatică.

Concluzie

Steatoza hepatică este o afecțiune frecventă care poate fi gestionată eficient prin schimbări în stilul de viață, inclusiv dietă și exerciții fizice.

Este important ca persoanele cu ficat gras să evite alimentele procesate, alcoolul și zaharurile rafinate, să adopte o dietă sănătoasă și să urmeze recomandările medicului pentru a preveni complicațiile severe.

Cine este dna Dr. Andra Zaharia

Sunt medic specialist în genetică medicală și expert în nutriție, absolventă a Facultății de Medicină Carol Davila. Cu acreditări în Nutrigenetică și Detoxifiere hepatică de la Institutul Genotipia, îmi dedic activitatea identificării soluțiilor personalizate care îmbină genetica și nutriția pentru a optimiza sănătatea pacienților. Cunostintele mi-au fost imbunatatite prin participarea la congrese, conferinte si workshopuri de specialitate precum „Locul Nutriției în Terapia Obezității," Ella Congres Events, 2023, unde am asimilat rolul crucial al nutriției în tratamentele avansate. Nutriția durerii este un subiect de suflet, pe care îl abordez cu o plaja larga de pacienții, oferindu-le soluții practice pentru a scădea inflamația din organism si intensitatea simptomatologiei dureroase. Motto: „Genetica ne oferă răspunsuri, nutriția soluții, dar fiecare pacient este unic și merită o abordare personalizată."

Consultație cu Dr. Andra Zaharia

Consultația durează 30 de minute și se desfășoară în regim de telemedicină, adică prin apel video la distanță. Rolul ei este să ne permită să explorăm în detaliu istoricul tău de sănătate, să identificăm provocări și obiective specifice și să-ți ofer indicații nutriționale personalizate pentru a combate afecțiuni metabolice, afecțiuni tiroidiene, hiperuricemie, hipercolesterolemie, afecțiuni cardiovasculare sau poate îți dorești să știi ce alimente poți să consumi, să combați durerea din organism sau poate vrei să știi ce poți face pentru a avea un păr sănătos și un ten radiant.

www.magazinrestartix.ro

Pentru programări sunați la

Telefon: +40 21 555 38 13